


## Епідемічна ситуація з ВІЛ-інфекції в Україні станом на 01.04.2017 р.\*

За період 1987-2017 (3 міс.) рр. серед громадян України зареєстровано 302 152 ВІЛ-інфіковані особи, у тому числі 95 366 з діагнозом СНІДу, 42 502 випадки смерті від захворювань, зумовлених СНІДом.

Станом на 01.04.2017 р., у ЗОЗ служби СНІДу під медичним наглядом перебувало 135 414 ВІЛ-інфікованих громадян України, з них 40 186 хворих з діагнозом СНІД. Показник поширеності ВІЛ-інфекції становив 319,5 на 100 тис. населення та на 5,9% був вище інтенсивного показника за відповідний період минулого року (301,8). Показник поширеності СНІДу становив 94,8 на 100 тис. населення та зріс проти показника відповідного періоду минулого року (82,8) на 14,5%. Найвищі рівні поширеності ВІЛ-інфекції реєструвались в Одеській (847,8 на 100 тис. населення), Дніпропетровській (831,6), Миколаївській (743,6), Херсонській (408,2), Київській (382,4), Чернігівській (375,0) областях та у м. Києві (415,9) (рис. 1).



**Рисунок 1.** Поширеність ВІЛ-інфекції та СНІДу за даними медичного нагляду по регіонах України станом на 01.04.2017 р.

За 3 місяці 2017 р. в Україні відмічається зростання кількості зареєстрованих ВІЛ-інфікованих громадян – взято на облік 4 725 ВІЛ-інфікованих осіб, що на 21,1% більше, ніж за аналогічний період 2016 р. (3 901 особа). Рівень захворюваності на ВІЛ-інфекцію в країні зріс на 21,6% та склав 11,1 на 100 тис. населення проти 9,1 у відповідний період 2016 р.

Перевищують середній показник по країні рівні захворюваності на ВІЛ-інфекцію Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Чернігівської областей та м. Києва.

Суттєве зростання захворюваності на ВІЛ-інфекцію за 3 міс. 2017 р., проти відповідного періоду 2016 р., зареєстровано у Вінницькій (темپ приросту +113,8%), Дніпропетровській (+61,6%), Кіровоградській (+61,5%), Луганській (85,4%), Хмельницькій (+62,4%), Чернігівській (45,2%) областях та м. Києві (34,0%).

У структурі шляхів передачі ВІЛ-інфекції серед осіб з уперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції продовжує зростати частка осіб із статевим (гомо- та гетеросексуальним) шляхом інфікування ВІЛ. За 3 місяці 2017 р. цей показник досяг 63,8% проти 59,7% за відповідний період минулого року. Частка осіб, які інфікувались ВІЛ унаслідок введення наркотичних речовин ін'єкційним шляхом, залишилась на тому ж рівні (21,2%).

Протягом першого кварталу 2017 р. зареєстровано 2 469 нових випадків СНІДу, у порівнянні з 2 086 випадками за відповідний період минулого року. Рівень захворюваності на СНІД в країні зріс на 18,9% та склав 5,8 на 100 тис. населення проти відповідного показника за 3 місяці 2016 р. (4,9). Зростання рівнів захворюваності на СНІД за 3 місяці 2017 р. проти відповідних показників за аналогічний період минулого року відбулось у 12 регіонах, найвищі темпи зростання зареєстровано у Вінницькій та Херсонській областях (+186,8% та +109,7%, відповідно). Перевищують середній показник по Україні показники захворюваності на СНІД Дніпропетровської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей. У 13 регіонах країни за 3 місяці 2017 р. зареєстровано зниження рівнів захворюваності на СНІД, у порівнянні з відповідними показниками минулого року. Найбільш суттєво захворюваність на СНІД знизилась у Чернівецькій та Тернопільській областях (-33,2% та -32,9%, відповідно).

За 3 місяці 2017 р. зареєстровано 792 випадки смерті від СНІДу проти 716 випадків за відповідний період минулого року. Показники смертності від СНІДу становили 1,9 та 1,7 на 100 тис. населення, відповідно. Темп зростання показника смертності від СНІДу склав 11,1%.

Збільшення регіональних показників смертності від СНІДу, у порівнянні з відповідними показниками минулого року, відмічається у 13 регіонах. Високі темпи приросту показника смертності від СНІДу зареєстровано у Волинській (78,1%), Миколаївській (83,9%), Одеській (39,8%), Сумській (41,1%), Харківській (121,4%), Херсонській (101,3%) областях та м. Києві (55,4%).

Показники смертності від СНІДу Дніпропетровської, Кіровоградської, Миколаївської та Одеської областей перевищують середній показник по Україні.

Основною ко-інфекцією та причиною смерті у хворих на СНІД залишається ТБ, який протягом першого кварталу 2017 р. став причиною смерті у кожному другому випадку смерті від СНІДу (415 померлих; 52,4% від кількості померлих від СНІДу).

*\*без урахування статистичних даних АР Крим з 2014 року та частини території проведення антитерористичної операції з 2015 року*