





ДОПОМОГА В РОБОТІ: ОЦІНКА КЛІНІЧНОЇ ВІДПОВІДНОСТІ ТА ПРОТИПОКАЗАНЬ

Оцініть наступні фактори, щоб визначити, чи клієнт клінічно підходить для PrEP:	Клінічні протипоказання або особливі міркування			
	Пероральна PrEP на основі TDF 	DVR вагинальное кольцо с дапивирином 	SAB-LA 	LEN 
1) ВІЧ статус	Якщо результати тесту на ВІЛ є позитивними або непереконливими, клієнтів слід направити на подальше обстеження/лікування.	Якщо результати тесту на ВІЛ є позитивними або непереконливими, клієнтів слід направити на подальше обстеження/лікування.	Якщо результати тесту на ВІЛ є позитивними або непереконливими, клієнтів слід направити на подальше обстеження/лікування.	Якщо результати тесту на ВІЛ є позитивними або непереконливими, клієнтів слід направити на подальше обстеження/лікування.
2) Показання до постконтактної профілактики (ПКП)	Якщо PrEP є вкрай необхідним, розпочніть 1-місячний курс PrEP для клієнта та відкладіть/призупиніть PrEP.	Якщо PrEP є вкрай необхідним, розпочніть 1-місячний курс PrEP для клієнта та відкладіть/призупиніть PrEP.	Якщо PrEP є вкрай необхідним, розпочніть 1-місячний курс PrEP для клієнта та відкладіть/призупиніть PrEP.	Якщо PrEP є вкрай необхідним, розпочніть 1-місячний курс PrEP для клієнта та відкладіть/призупиніть PrEP.
3) Підозра на гостру ВІЛ-інфекцію (АНІ)	Якщо є висока ймовірність АНІ, відкладіть/призупиніть PrEP. Порадьте клієнту повернутися через 1 місяць для повторного тестування.	Якщо є висока ймовірність АНІ, проведіть скринінг на відповідність критеріям та повторне тестування через 1 місяць. DVR можна використовувати, незважаючи на підозру на АНІ.	Якщо є висока ймовірність АНІ, відкладіть/призупиніть PrEP. Порадьте клієнту повернутися через 1 місяць для повторного тестування.	Якщо є висока ймовірність АНІ, відкладіть/призупиніть PrEP. Порадьте клієнту повернутися через 1 місяць для повторного тестування.
4) Можливі взаємодії з іншими лікарськими засобами	<p><b>Протипоказання:</b></p> <p>Пероральна PrEP на основі TDF не протипоказана при прийомі більшості загальноживаних ліків.</p> <p><b>Рекомендації:</b></p> <p>Якщо клієнтка приймає гормони на основі естрадіолу: використовуйте тільки схему дозування/графік прийому на основі TDF, рекомендований для жінок-цисгендерів, трансгендерних жінок, які приймають гормони для підтвердження статі, та трансгендерних чоловіків.</p>	<p><b>Протипоказання:</b></p> <p>Не застосовувати одночасно з вагінальними кільцями або діафрагмами для контрацепції; уникати застосування з вагінально введеним метронідазолом або кліндамицином.</p> <p><b>Застереження:</b></p> <p>Одночасне застосування вагінально введеного клотримазолу слід проводити з обережністю.</p> <p>При одночасному застосуванні з вагінально введеним міконазолом слід пропонувати презервативи.</p>	<p><b>Протипоказання:</b></p> <p>Не застосовувати у поєднанні з:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• рифампіном</li><li>• окскарбазепіном</li><li>• рифапентином</li><li>• фенобарбіталом</li><li>• карбамазепіном</li><li>• фенітоїном</li></ul> <p><b>Рекомендації:</b></p> <p>При застосуванні у поєднанні з рифабутином може знадобитися коригування дози, і лікарі, які призначають препарат, повинні ознайомитися з інструкціями обох препаратів, коли призначають їх для одночасного застосування.</p>	<p><b>Протипоказання:</b></p> <p>Невідомі ліки, які протипоказані при застосуванні LEN.</p> <p><b>Рекомендації:</b></p> <p>При одночасному застосуванні будь-якого з наведених нижче ліків разом з LEN або протягом декількох місяців після припинення прийому LEN може знадобитися коригування дози (дози LEN або іншого ліку).</p> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Rifabutin</li><li>• Rifampicin</li><li>• Rifapentine</li><li>• Carbamazepine</li><li>• Phenobarbital</li></ul><ul style="list-style-type: none"><li>• Phenytoin</li><li>• Ketamine</li><li>• Avanafil</li><li>• Sildenafil</li><li>• Tadalafil</li><li>• Vardenafil</li></ul></div>
5) Можливі алергії на ліки	Якщо у пацієнта раніше спостерігалася алергічна реакція на препарати на основі TDF, FTC або 3TC, рекомендуйте альтернативний препарат для PrEP.	Якщо у клієнта раніше спостерігалася алергічна реакція на DVR, рекомендуйте альтернативний препарат PrEP.	Якщо у пацієнта раніше спостерігалася алергічна реакція на каботегравір, рекомендуйте альтернативний препарат для профілактики ВІЛ-інфекції.	Якщо у пацієнта раніше спостерігалася алергічна реакція на каботегравір, рекомендуйте альтернативний препарат для профілактики ВІЛ-інфекції.
6) Відповідні супутні захворювання	Якщо у пацієнта порушена функція нирок (CrCl < 60 мл/хв або eGFR 60 мл/хв на 1,73 м2 ), рекомендуйте альтернативний препарат PrEP.	Якщо у клієнтки є серйозні проблеми зі здоров'ям піхви, лікуйте їх перед початком або продовженням DVR.	Якщо відомо, що у клієнта порушена функція печінки (тобто хронічне захворювання печінки або гострий гепатит), рекомендуйте альтернативний препарат PrEP.	Невідомі супутні захворювання, які потребують оцінки.
	Примітка: тестування функції нирок є обов'язковим, якщо клієнт молодший 49 років і не має супутніх захворювань нирок.	Примітка: огляд за допомогою дзеркала не є обов'язковим.	Примітка: перед початком лікування препаратом SAB-LA не потрібно проводити тестування на вірусний гепатит або функцію печінки.	