


ДОПОМОГА В РОБОТІ: СЦЕНАРІЙ ЗМІНИ КОНЦЕНТРАЦІЇ САВ

СЦЕНАРІЙ 1: ПОДАЧА САВ-LA ТА СВОЄЧАСНЕ ПОВЕРНЕННЯ ДЛЯ ВСІХ ПОВТОРНИХ ІН'ЄКЦІЙ


Цей графік відображає зміни концентрації САВ між ін'єкціями САВ-LA у клієнта, який повертається згідно з графіком (без затримок).



СЦЕНАРІЙ 2 ДЛЯ САВ-LA (ПРОПУЩЕНА ІН'ЄКЦІЯ № 2): НЕЗАПЛАНОВАНЕ ПІЗНЄ ПОВЕРНЕННЯ ДЛЯ ІНІЦІАЦІЙНОЇ ІН'ЄКЦІЇ № 2 САВ-LA В ПЕРІОД 6-8 ТИЖНІВ З МОМЕНТУ ПОПЕРЕДНЬОЇ ІН'ЄКЦІЇ


Клієнт пропустив заплановану ІНІЦІАЦІЙНУ ІН'ЄКЦІЮ № 2, але повертається через 6-8 тижнів після попередньої ін'єкції.

Захист у цей період є невизначеним, але повторний запуск САВ-LA не є необхідним. Продовжуйте з ІНІЦІАЦІЙНОЮ ІН'ЄКЦІЄЮ № 2.




СЦЕНАРІЙ 3 ДЛЯ САВ-LA (ПРОПУЩЕНА ІН'ЄКЦІЯ № 2): НЕЗАПЛАНОВАНЕ ПІЗНЄ ПОВЕРНЕННЯ ДЛЯ ІН'ЄКЦІЇ № 2 ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ САВ-LA ЧЕРЕЗ 9 ТИЖНІВ ПІСЛЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ІН'ЄКЦІЇ

Клієнт пропустив заплановану ІНІЦІАЦІЙНУ ІН'ЄКЦІЮ № 2, але повертається через 9+ тижнів після попередньої ін'єкції. У цей період захист відсутній. Почніть САВ-LA знову з ІНІЦІАЦІЙНОЇ ІН'ЄКЦІЇ № 1.




СЦЕНАРІЙ 4 (ПРОПУЩЕНА ПОВТОРНА ІН'ЄКЦІЯ): НЕЗАПЛАНОВАНЕ ПОВЕРНЕННЯ ДЛЯ ПОВТОРНОЇ ІН'ЄКЦІЇ САВ-LA В ПЕРІОД 10-12 ТИЖНІВ ПІСЛЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ІН'ЄКЦІЇ

Клієнт пропустив заплановану ПОВТОРНУ ІН'ЄКЦІЮ, але повертається через 10-12 тижнів після попередньої ін'єкції. Захист у цей період є невизначеним, але повторний запуск САВ-LA не є необхідним. Продовжуйте з ПОВТОРНОЮ ІН'ЄКЦІЄЮ.




СЦЕНАРІЙ 5 ДЛЯ САВ-LA (ПРОПУЩЕНА ПОВТОРНА ІН'ЄКЦІЯ): НЕЗАПЛАНОВАНЕ ПОВЕРНЕННЯ ДЛЯ ПОВТОРНОЇ ІН'ЄКЦІЇ САВ-LA ЧЕРЕЗ 13 ТИЖНІВ І БІЛЬШЕ ПІСЛЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ІН'ЄКЦІЇ

Клієнт пропустив заплановану ПОВТОРНУ ІН'ЄКЦІЮ, але повертається через 13+ тижнів після попередньої ін'єкції. У цей період захист відсутній. Почніть САВ-LA з ПЕРШОЇ ІН'ЄКЦІЇ.



СЦЕНАРІЙ 6 (ПРИПИНЕННЯ): ЗАКІНЧЕННЯ

Оскільки ін'єкційний каботегравір є препаратом тривалої дії, він залишається в організмі протягом 12 місяців після останньої ін'єкції; однак з часом рівень препарату в організмі знижується, і він не забезпечує захист від ВІЛ.




ДОПОМОГА В РОБОТІ: СЦЕНАРІЙ ЗМІНИ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЛЕН

ЛЕНАКАПІВ СЦЕНАРІЙ 1: ПОДАЧА ЛЕНУ ТА СВОЄЧАСНЕ ПОВЕРНЕННЯ ДЛЯ ВСІХ ПОВТОРНИХ ВВЕДЕНЬ


ЛЕНДАРНА
НЕ ЗАХИЩЕНИЙ ВІД ВІП ЗАХИЩЕНИЙ ВІД ВІП

Цей графік відображає зміни концентрації ЛЕН між ін'єкціями ЛЕН у пацієнта, який повертається згідно з графіком (без затримок).




ЛЕНАКАПІВ СЦЕНАРІЙ 2 (ПРОПУЩЕНА ПОВТОРНА ІН'ЄКЦІЯ): НЕЗАПЛАНОВАНЕ ПОВЕРНЕННЯ ДЛЯ ПОВТОРНИХ ІН'ЄКЦІЙ ЛЕНАКАПІВУ >28 ТИЖНІВ 3 МОМЕНТУ ПОПЕРЕДНЬОЇ ІН'ЄКЦІЇ

Клієнт пропустив заплановану ПОВТОРНУ ІН'ЄКЦІЮ, але повернувся через 29+ тижнів після попередньої ін'єкції. Захист у цей період відсутній. Почніть ЛЕН за СХЕМОЮ ПОДАЧІ.



ЛЕНАКАПІВІР СЦЕНАРІЙ 3 (ПРИПИНЕННЯ): ЗАКІНЧЕННЯ ФАЗИ

Оскільки ін'єкційний ленакапівір є препаратом тривалої дії, він залишається в організмі протягом 12 місяців після останньої ін'єкції; однак з часом рівень препарату в організмі знижується, і він не забезпечує захист від ВІЛ.



РЕЖИМ ІНІЦІАЦІЇ

ПОЧАТКОВИЙ РЕЖИМ ТА ЧАС ДО ЗАХИСТУ

Ця ж інформація стосується клієнтів, які поновлюють використання продукту після припинення або певного періоду невикористання

Пероральний препарат

Примітка: Для забезпечення захисту необхідно продовжувати прийом після останнього дня експозиції захисту (див. розділ «Припинення прийому»)



ДАПІВІРИН
ВАГІНАЛЬНИЙ
КІЛЬЦЕ



КАБОТЕГРАВІР



ЛЕНАКАПІВІР



<div>Група</div> <div>Клієнт приймає 1 таблетку на день протягом 7 послідовних днів</div> <div></div> <div>Захист починається після 7 днів поспіль використання</div>	<div>Група</div> <div>Клієнт приймає 2 таблетки разом («завантажу вальна доза»)</div> <div></div> <div>Захист починається через 2-24 години після прийому навантажувальної дози; навантажувальну дозу бажано приймати ближче до 24 годин перед статевим актом*</div>	<div>Клієнт або постачальник вставляє DVR відповідно до інструкціями з введення</div> <div></div> <div>Захист починається через 24 години після введення DVR</div>	<div>Ввести дві ін'єкції CAB-LA з інтервалом в 1 місяць (+/- 7 днів) відповідно до інструкцій щодо введення</div> <div>День 0</div> <div>Постачальник вводить ПЕРШУ ІН'ЄКЦІЮ</div> <div>Місяць</div> <div>Медичний працівник вводить ПЕРШУ ІН'ЄКЦІЮ 2</div> <div></div> <div>Захист починається приблизно через 1 тиждень після ПОДАЧІ ІН'ЄКЦІЯ 1</div>	<div>Вводиться кілька доз перорального та ін'єкційного LEN, що називається РЕЖИМОМ ІНІЦІАЦІЇ LEN, протягом двох послідовних днів:</div> <div>День 0</div> <div>Медичний працівник вводить ІНІЦІАЦІЙНУ ІН'ЄКЦІЮ 1 та ІНІЦІАЦІЙНУ ІН'ЄКЦІЮ 2 в різні місця відповідно до інструкцій щодо ін'єкцій</div> <div>Клієнт приймає 2 таблетки LEN, які називаються НАЧАЛЬНИМИ ТАБЛЕТКАМИ 1 та 2</div> <div>День</div> <div>Клієнт приймає 2 таблетки LEN, які називаються ТАБЛЕТКАМИ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ 3 та 4</div> <div></div> <div>Захист починається протягом 1 дня після завершення ІНІЦІАЦІЙНИХ ІН'ЄКЦІЙ 1 і 2 та ПРИЙОМУ ТАБЛЕТОК 1 і 2 (день 0) ВІДПОВІДНО ДО СХЕМИ ПОДАЧІ</div>
--	---	---	--	--

Група **A:** Жінки-цис, жінки-транс, які приймають гормони для підтвердження статі, чоловіки-транс та будь-які особи, які використовують пероральну PrEP на основі TDF для профілактики ВІЛ при ін'єкційному вживанні наркотиків.

Група **B:** Чоловіки-цисгендери та трансгендерні жінки, які не приймають гормони для підтвердження статі, використовують пероральну PrEP на основі TDF для запобігання зараженню ВІЛ статевим шляхом

*застосовується незалежно від того, чи клієнт використовує пероральну PrEP на основі TDF постійно, чи за необхідністю

ПРОДОВЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ПІДТРИМКА ЗАХИСТУ ПІСЛЯ ПОЧАТКУ ЗАХИСТУ

ПРОФІЛАКТИКА А ПРЕЕКСПОЗИЦІЙ



ДАПІВІРИН ВАГІНАЛЬНИЙ КІЛЬЦЕ



КАБОТЕГРАВІР ДОВГОДІЮЧИЙ



ЛЕНАКАПІВІР



Група

Клієнт приймає 1 таблетку на день протягом усього періоду, коли необхідний захист, який для деяких може бути для деяких людей бути невизначеним, а для інших – коротшим

Група

Клієнт приймає 1 таблетку на день протягом усього періоду, коли необхідний захист, який для деяких може бути для деяких може бути невизначеним, а для інших – короткостроковим*

Клієнтка залишає ДВР на місці, незалежно від часу/частоти статевих контактів (або менструації) і не повинен витягувати його відразу після статевого акту, оскільки після зняття захист від ВІЛ швидко знижується. DVR слід знімати тільки після того, як він пробув на місці протягом одного місяця

ДВА РАЗИ НА МІСЯЦЬ: Медичний працівник проводить ПОВТОРНІ ІН'ЄКЦІЇ кожні ДВА місяці (+/- 7 днів) відповідно до інструкцій щодо ін'єкцій

ДВА РАЗИ НА РІК: Медичний працівник вводить ПОВТОРНІ ІН'ЄКЦІЇ кожні ШІСТЬ місяців/26 тижнів (+/- 14 днів) відповідно до інструкціями щодо ін'єкцій

ПРОПУЩЕНІ ДОЗИ

Для всіх продуктів клієнтам, які пропустили кілька доз або не використовували препарат протягом тривалого часу, може знадобитися повторне тестування на ВІЛ та клінічна оцінка щодо показань до ПЕП та підозри на АГІ перед поновленням або продовженням ПРЕП

Для клієнтів, які пропустили заплановану ін'єкцію, постачальник послуг визначає, чи слід розпочати знову або продовжити:

Для клієнтів, які пропустили заплановану ін'єкцію, постачальник визначає, чи слід розпочати знову, чи

продовжувати:

Клієнт повинен прийняти пропущену дозу, як тільки це можливо, але не слід приймати більше 2 доз протягом одного дня

Клієнт повинен прийняти пропущену дозу, як тільки це можливо, але не повинен приймати більше 2 доз за один день

вставте його якомога швидше

Якщо остання ін'єкція була ПЕРШОЮ ІН'ЄКЦІЄЮ:

Якщо минуло ≤ 2 місяці, продовжуйте з ІНІЦІАЦІЙНОЮ ІН'ЄКЦІЄЮ № 2

>2 місяці минуло, перезапустіть з ІНІЦІАЦІЙНОЮ ІН'ЄКЦІЄЮ № 1

- ♦ Якщо останнє введення було ПЕРШЕ ВВЕДЕННЯ № 2 або ПОВТОРНЕ
- ♦ ІН'ЄКЦІЯ:

♦ ≤3 місяці, продовжуйте з ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНОЮ ІН'ЄКЦІЄЮ

♦ >3 місяці, почніть знову з ПЕРШОЮ ІН'ЄКЦІЄЮ № 1

Якщо з моменту попередньої ін'єкції минуло ≤28 тижнів, продовжуйте з ПОВТОРНОЮ ІН'ЄКЦІЄЮ

- ♦ Якщо минуло більше 28 тижнів з моменту попереднього ін'єкції Почніть LEN з усіх доз (пероральних та ін'єкційних) у РЕЖИМІ ПОДАЧІ
- ♦

Група **A:** жінки-цисгендерки, трансгендерні жінки, які приймають гормони для підтвердження статі, трансгендерні чоловіки та всі, хто використовує пероральну PrEP на основі TDF для профілактики ВІЛ при ін'єкційному вживанні наркотиків

Група **B:** Чоловіки-цисгендери та трансгендерні жінки, які не приймають гормони для підтвердження статі, які використовують пероральну PrEP на основі TDF для профілактики інфікування ВІЛ статевим шляхом

*застосовується незалежно від того, чи клієнт використовує пероральну PrEP на основі TDF постійно, чи за необхідністю

ПРИПИНИТИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ПРОВОДИТИ КЛІНІЧНИЙ МОНІТОРИНГ

ORAL PrEP



Група

Клієнт продовжує приймати 1 таблетку на день протягом 7 додаткових днів після останнього дня експозиції

Клінічний моніторинг після припинення прийому не потрібний

Група В

Клієнтка продовжує приймати 1 таблетку на день протягом 2 додаткових днів після останнього дня експозиції*

Клінічний моніторинг після припинення прийому не потрібний

ДАПІВІРИН ВАГІНАЛЬНИЙ КІЛЬЦЕ



Постачальник послуг або клієнт видаляє DVR відповідно до інструкцій з видалення, і захист припиняється після видалення

Клінічний моніторинг після припинення прийому не є необхідним

ДОВГОДІЮЧИЙ КАБОТЕГРАВІР



CAB-LA залишається в організмі приблизно 1 рік після останньої ін'єкції (період «хвоста»), при цьому рівні занадто низькі, щоб забезпечити захист протягом останніх 10-11 місяців хвостового періоду

Після припинення лікування рекомендуються щоквартальні візити протягом усього періоду «хвоста» для тестування на ВІЛ та оцінку потреб у профілактиці

ЛЕНАКАПІВ



LEN залишається в організмі приблизно протягом 1 року після останньої ін'єкції (період «хвоста»), при цьому його рівень є занадто низьким, щоб забезпечити захист протягом останніх 6 місяців хвоста

Після припинення протягом періоду хвоста рекомендуються щоквартальні візити для тестування на ВІЛ та оцінки потреб у профілактиці

Для пероральної **PrEP** на основі **TDF**:

Група **A**: цис-жінки, транс-жінки, які приймають гормони для підтвердження статі, транс-чоловіки та всі, хто використовує пероральну PrEP на основі TDF для профілактики ВІЛ при ін'єкційному вживанні наркотиків


Група **B**: Чоловіки-цисгендери та трансгендерні жінки, які не приймають гормони для підтвердження статі, які використовують пероральну PrEP на основі TDF для профілактики інфікування ВІЛ статевим шляхом

*застосовується незалежно від того, чи клієнт приймає пероральну PrEP на основі TDF постійно, чи за необхідністю

ПЕРЕХІД ВІД PREP НА ОСНОВІ ТДФ


ДО DVR

Клієнти повинні продовжувати використовувати пероральний PrEP на основі TDF протягом **7** днів після введення DVR




ДО CAB-LA

Клієнти повинні продовжувати приймати пероральний PrEP на основі TDF протягом **7** днів після початку прийому CAB-LA ІН'ЄКЦІЯ № 1



ДО LEN


Клієнти повинні продовжувати прийом пероральної PrEP на основі TDF протягом **2** днів після СХЕМИ ПОДАЧІ LEN



ПЕРЕХІД З ДАПІВІРИНОВОГО ВАГІНАЛЬНОГО КІЛЬЦЯ (DVR)


ДО ПРЕПАРАТУ PREP

Клієнти повинні продовжувати використовувати DVR протягом **7** днів після початку прийому пероральної PrEP на основі TDF




ДО CAB-LA

Клієнти повинні продовжувати використовувати DVR протягом **7** днів після початку прийому CAB-LA ІН'ЄКЦІЯ № 1



ДО LEN

Клієнти повинні продовжувати носити DVR протягом обох днів отримання СХЕМИ ПОКРАЩЕННЯ, щоб розпочати LEN (всі дози)



ПЕРЕХІД З CAB-LA

ДО ПЕРОРАЛЬНОГО
ПРЕП

Якщо останнє введення було ПЕРШИМ ВВЕДЕННЯМ № 1, клієнт повинен розпочати пероральний прийом PrEP на основі TDF через **1** місяць після останнього введення

ПЕРША ІН'ЄКЦІЯ CAB-LA № 1



ОДИН МІСЯЦЬ

CAB-LA ІНІЦІАЦІЙНА ІН'ЄКЦІЯ № 2 або

КОНТРОЛЬНА ІН'ЄКЦІЯ

Попереднє використання CAB-LA



ПОЧАТОК ПІДГОТОВКИ ДО ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИЙОМУ



Майбутнє пероральне застосування PrEP



Якщо останнє введення було ІНІЦІАЦІЙНИМ

ІН'ЄКЦІЯ № 2 або ПОДАЛЬШЕ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

ІН'ЄКЦІЯ, клієнт повинен розпочати пероральний прийом PrEP на основі TDF через **2** місяці після останньої ін'єкції

ПОЧАТОК ПРЕПАРАТУ ВСЕРЕДНЬО



Майбутнє пероральне застосування PrEP



ДО DVR

Якщо остання ін'єкція була ПЕРШОЮ ІН'ЄКЦІЄЮ, клієнт повинен вставити DVR через **1** місяць після останньої ін'єкції

CAB-LA ПЕРША ІН'ЄКЦІЯ № 1



ОДИН МІСЯЦЬ
ВВЕДЕННЯ CAB-LA № 2 або ПОВТОРНЕ ВВЕДЕННЯ

Попереднє застосування CAB-LA




ВСТАВИТИ DVR



Майбутнє використання DVR



Якщо останнє ін'єкційне введення було ПЕРШОЮ ІН'ЄКЦІЄЮ № 2 або ПОВТОРНОЮ ІН'ЄКЦІЄЮ, клієнт повинен вставити DVR через **2** місяці після останньої ін'єкції



ДВА МІСЯЦІ



ВСТАВИТИ DVR

Майбутнє використання DVR



ДО ЛЕН

Якщо останнє введення CAB-LA було ПЕРШИМ ВВЕДЕННЯМ № 1, клієнт повинен розпочати РЕЖИМ ІНІЦІАЦІЇ ЛЕН через **1** місяць після останньої ін'єкції CAB-LA

ПЕРША ІН'ЄКЦІЯ CAB-LA



ОДИН МІСЯЦЬ

ПЕРША ІН'ЄКЦІЯ CAB-LA № 2 або ПОВТОРНА ІН'ЄКЦІЯ

РЕЖИМ ІНІЦІАЦІЇ ЛЕН



Майбутні ін'єкції ЛЕН



Якщо останньою ін'єкцією CAB-LA була ІНІЦІАЦІЙНА ІН'ЄКЦІЯ № 2 або ПОВТОРНОЮ ІН'ЄКЦІЄЮ, клієнт повинен розпочати РЕЖИМ ІНІЦІАЦІЇ ЛЕН **2** місяців після останньої ін'єкції CAB-LA

Попереднє використання CAB-LA



ДВА МІСЯЦІ

РЕЖИМ ПОДАЧІ ЛЕН



Майбутні ін'єкції ЛЕН




ПЕРЕХІД ВІД ЛЕН

ПРЕП

Клієнти повинні розпочати пероральну профілактику на основі TDF через **6** місяців після останнього введення ін'єкцій ЛЕН, незалежно від типу останніх введених ін'єкцій ЛЕН.

Попереднє використання ЛЕН

ІН'ЄКЦІЇ ЛЕН




ШІСТЬ МІСЯЦІВ

ПОЧАТОК ПІДГОТОВКИ



Майбутнє застосування пероральних препаратів PrEP



Клієнти повинні встановити DVR через **6** місяців після останнього введення ін'єкцій ЛЕН, незалежно від типу ЛЕН ін'єкцій, введених востаннє

Попереднє застосування ЛЕН

ІН'ЄКЦІЇ ЛЕН




ШІСТЬ МІСЯЦІВ

ВСТАВИТИ DVR



Майбутнє використання DVR



Клієнти повинні розпочати прийом CAB-LA через **6** місяців після останнього введення ін'єкцій ЛЕН, незалежно від типу ЛЕН останні введені ін'єкції

Попереднє застосування ЛЕН

ІН'ЄКЦІЇ ЛЕН



ШІСТЬ МІСЯЦІВ

CAB-LA INIT INJ#1



Майбутні ін'єкції CAB-LA



ДО CAB-LA

ДОПОМОГА В РОБОТІ: ВИКОРИСТАННЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПЕРЕНЕСЕННЯ ВСТРИКІВ CAB-LA I LEN


CAB-LA

ПРИМІТКА: ІНІЦІАЦІЙНА ІН'ЄКЦІЯ № 2 не може бути відкладена

Якщо клієнт потребує відстрочки майбутніх ПОВТОРНИХ ІН'ЄКЦІЙ CAB-LA, медичні працівники можуть використовувати пероральні препарати PrEP на основі TDF для «перекриття» між ін'єкціями. Якщо медичний працівник вирішує відстрочити наступну ін'єкцію за допомогою пероральних препаратів PrEP на основі TDF

міст, клієнт сьогодні отримає як ін'єкцію CAB-LA, так і запас перорального PrEP на основі TDF, який слід приймати з інструкцією почати приймати пероральний PrEP на основі TDF через два місяці від сьогоднішнього дня і продовжувати приймати його щодня.

- Щоб розрахувати кількість пероральних препаратів PrEP на основі TDF, які потрібно призначити, розрахуйте кількість днів у періоду відстрочки [Період А - 60 днів]




Після перорального PrEP-містка медичні працівники повинні прийняти рішення про **відновлення** або **поновлення** CAB-LA. Це рішення базується на тривалості періоду між датою сьогоднішньої ін'єкції та першою можливою датою повернення (період А).

- Якщо період А становить ≤ 3 місяці: відновлюйте лікування з ПОВТОРНОЮ ІН'ЄКЦІЄЮ
- Якщо період А > 3 місяці: Повторний запуск з ІНІЦІАЦІЙНОЮ ІН'ЄКЦІЄЮ № 1 (з подальшою ІНІЦІАЦІЙНОЮ ІН'ЄКЦІЄЮ № 2 через місяць)

ЛЕНАКАПІВІР

Якщо клієнт потребує відстрочки майбутніх ін'єкцій LEN, медичні працівники можуть використовувати пероральний LEN для «перекриття» періоду між ін'єкціями. Якщо медичний працівник вирішить відстрочити наступну ін'єкцію за допомогою перорального LEN, клієнт отримає сьогодні як ін'єкції LEN, так і запас перорального LEN, який він зможе взяти з собою, з інструкціями щодо початку прийому перорального LEN через шість місяців, по одній таблетці на тиждень.

- Щоб розрахувати кількість перорального LEN, яку потрібно призначити, обчисліть кількість тижнів у періоді відстрочки [Період А - 26 тижнів].



Після перорального LEN-містка лікарі повинні призначити ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНІ ІН'ЄКЦІЇ. Немає необхідності поновлювати LEN за СХЕМОЮ ПОДАЧІ після перорального LEN-містка, за винятком випадків, коли дотримання тижневих доз було недостатнім.