

Надання підтримки Україні у розвитку сучасної системи громадського здоров'я


13.05.2019-12.05.2022

ВІДПОВІДЬ НА ПАНДЕМІЮ «КОВІД-19» ЩО МИ ДІЗНАЛИСЬ?


Епідеміологічні аспекти

Проф. Д-р мед. Ральф Рейнтжес

Figure 2. Number of confirmed COVID-19 cases, by date of report and WHO region, 30 December 2019 through 01 June 2020**




**See [Annex 1](#) for data, table and figure notes.




Повідомлені випадки COVID-19 у Німеччині (01.03.2020-31.05.2020)

джерело даних: www.worldometers.info



Daily New Cases


Cases per Day
Data as of 0:00 GMT+0




Наступні питання будуть обговорені

- Яке співвідношення вікових груп пацієнтів та які супутні захворювання є найвищими ризиками летального результату?
- Наскільки міцний імунітет після захворювання та чи є випадки реінфекції?
- Як часто заражаються медичні працівники та які профілактичні заходи є найбільш ефективними?

Яке співвідношення вікових груп щодо летального результату?



Які супутні захворювання є найвищими ризиками летального результату?



Наскільки міцний імунітет після захворювання та чи є випадки повторного інфікування?

Наразі немає доказів того, що люди, які одужали від COVID-19 та мають антитіла, захищені від другої інфекції.


Проте експерти очікують, що в цей момент пацієнти, що одужали, мають лише невеликий ризик повторної інфекції.

Перші дослідження показали, що у осіб, які мали інфекцію SARS-CoV-2, виробляються специфічні антитіла. Досвід інших коронавірусів показує, що можна очікувати хоча б часткового імунітету до трьох років.

Як часто заражаються медичні працівники та які профілактичні заходи є найбільш ефективними?


Нозокоміальне розповсюдження є великою рушійною силою для ГРВІ та MERS (у Німеччині 11%, станом на 19.05.2020)

Велика кількість неповідомлених випадків



Засоби індивідуального захисту

HAND HYGIENE



AREAS LESS
LIKELY TO
BE MISSED

AREAS MORE
LIKELY TO
BE MISSED


www.scmp.com

Strand of human hair:
15 microns in diameter


Coronavirus
0.12 microns diameter

Surgical mask
diameter filtration
capacity (2–10 microns)

N95 mask
diameter filtration
capacity (0.3 microns)



Surgical Masks



N95

FACE

Goggles or face shield to prevent exposure of the eye mucosa to the virus. The goggles must fit the contours of the user's face and be compatible with the respirator.



RESPIRATORY

FFP2* or FFP3*
If filtering facepiece (FFP) respirators are not available, the use of a surgical or procedural mask is recommended.

BODY


Disposable long-sleeved
water-resistant gown

Mobile phones
wrapped in plastic

Rubber gloves fixed
with adhesive tape

Adult nappies: "When doctors
and nurses are in the ward
(dressed in protective clothing
that seals them off from the
environment), they cannot eat,
drink or go to the bathroom***"

Shoes wrapped
in plastic



Дякуємо за увагу!

Контакти:

Керівник проекту
Предраг Дюріч, MD, PhD
Офіс Проекту GFA у Києві, Україна
04071, Київ, вул. Ярославська 41
Тел.: +380 44 425 43 54
Електронна пошта: Predrag.Duric@gfa-group.de