

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ)

ПОЗИЦІЯ № 03-10/2022-1

(офіційна заява)

Щодо рекомендації МОЗ України стосовно заходів з імунопрофілактики

Рекомендації НТГЕІ щодо використання під час щеплення первинного вакцинального комплексу дітям за віком та з порушенням календаря комбінованої п'ятивалентної вакцини у складі дифтерії, кашлюку, правця, гепатиту В і гемофільної інфекції типу В (АКДП-ХІБ-ГепВ).

- НТГЕІ наголошує на важливості високого рівня охоплення щепленнями у відповідності до чинного календаря профілактичних щеплень для забезпечення захисту від інфекцій, які можуть бути попереджені вакцинацією.
- У випадку виникнення дефіциту/відсутності вакцин для щеплення дітей за календарем щеплень може бути використана наступна схема вакцинації для дітей першого року життя залежно від проведеного щеплення проти гепатиту В в період новонародженості

Чи проведена вакцинація проти гепатиту В в період новонародженості?	Вік новонароджених			
	2 місяців	4 міс	6 міс	18 міс
так (перша доза вакцини проти гепатиту В введена)	АКДП-ХІБ- ГепВ	АКДП-ХІБ- ГепВ	АКДП-ХІБ- ГепВ	АКДП
	АКДП-ХІБ- ГепВ	АКДП+ХІБ	АКДП-ХІБ- ГепВ	АКДП
ні	АКДП-ХІБ- ГепВ	АКДП-ХІБ- ГепВ	АКДП-ХІБ- ГепВ	АКДП-ХІБ- ГепВ
	АКДП-ХІБ- ГепВ	АКДП-ХІБ- ГепВ	АКДП-ХІБ- ГепВ	АКДП

АКДП-ХІБ-Геп-В - комбінована вакцина для профілактики кашлюка, дифтерії, правця, гепатиту В та ХІБ-інфекції з цільноклітинним кашлюковим компонентом;

АКДП - комбінована вакцина для профілактики кашлюка, дифтерії, правця з цільноклітинним кашлюковим компонентом;

АКДП+ХІБ - одночасне введення вакцин АКДП та вакцини проти ХІБ-інфекції.

- У разі порушення календаря щеплень вакцинація проводиться з урахуванням дотримання мінімального інтервалу між введенням вакцин проти кашлюка, дифтерії та правця - 4 тижні між 1 та 2 дозою, 2 та 3 дозою, та 6 місяців - між 3 та

4 дозою. При цьому введення чергових доз вакцини має збігатися з вакцинацією за віком, якщо дитиною не досягнуто даного віку і дозволяє мінімальний інтервал між введенням доз.

ПОЗИЦІЯ № 03-10/2022-2

(офіційна заява)

Щодо рекомендації МОЗ України стосовно окремих питань вакцинації проти COVID-19 в Україні

Дані рекомендації НТГЕІ стосуються окремих питань вакцинації проти COVID-19 та мають рекомендований характер.

Рекомендації НТГЕІ щодо застосування бустерних доз вакцини проти COVID-19 у дітей віком понад 12 років.

- НТГЕІ наголошує на важливості пріоритетного отримання отримання первинної вакцинації дітей з групи ризику тяжкого перебігу COVID-19 з наступним отриманням ними першої бустерної дози вакцини.
- Для першого бустерного щеплення використовувати вакцину на мРНК платформі, що схвалена до використання в даній віковій групі.
- Першу бустерну дозу рекомендовано вводити з дотриманням інтервалу в 6 місяців після первинної вакцинації (для тих, хто потребує введення додаткової дози - через 3 місяці).
- НТГЕІ продовжує рекомендувати отримання первинної вакцинації проти COVID-19 за універсальним принципом для дітей віком понад 12 років. Разом з тим, НТГЕІ вважає, що за зверненням батьків, дитина може отримати перший бустер при наявності достатньої кількості доз вакцини для осіб з групи пріоритетної вакцинації проти COVID-19.
- Питання бустерної вакцинації дітей віком до 12 років та застосування другої бустерної дози у дітей віком понад 12 років потребує додаткового вивчення.