

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ)

ПОЗИЦІЯ № 14-04/2023-2

(офіційна заява)

Щодо рекомендації МОЗ України стосовно заходів з імунопрофілактики

Дані рекомендації НТГЕІ мають рекомендований характер.

Щодо можливості використання вакцин АКДП, АДП-м для проведення ревакцинації дітей у віці 6 років відповідно до Календаря профілактичних щеплень.

- НТГЕІ висловлює занепокоєння щодо низьких рівнів охоплення плановими щепленнями та наголошує на важливості досягнення високого рівня охоплення вакцинацією проти інфекційних хвороб, щеплення яких передбачено Календарем та проти COVID-19 (особливо осіб з груп ризику).
- Наукові докази свідчать про те, що використання АДП-М (Td) як другої ревакцинальної дози у дітей віком 4–7 років забезпечує адекватну імунну відповідь та стійкий імунітет.
- НТГЕІ вважає, що з вакцина АДП-М має доведений високий профіль безпеки та імуногенності при застосуванні її в якості ревакцинальної дози у віці 6 років та може бути використана в умовах дефіциту/відсутності вакцини АДП для проведення ревакцинації у віці 6 років для забезпечення сталості функціонування програми з імунопрофілактики. Альтернативою, при виникненні умов дефіциту/відсутності АДП, є застосування для ревакцинації вакцини АКДП (вакцина проти дифтерії, правця та коклюшу з цілюноклітинним коклюшним компонентом, DTwP). При наявності двох вакцин АДП-М та АКДП рекомендовано надавати перевагу вакцині зі зменшеним вмістом дифтерійного та правцевого антигенів - АДП-М перед АКДП зважаючи на вищу реактогенність вакцини АКДП при застосуванні в даному віці.
- Разом з тим, НТГЕІ наголошує, що вакцини АДП-М зареєстровані в Україні, не мають показань до їх використання у дітей віком до 7 років. Вакцини АКДП у відповідності до інструкції з застосування може застосовуватися до 7 років (6 років 11 місяців 29 днів). Тому питання використання АДП-М у дітей віком до 7 років в якості другою ревакцинальної дози в 6 років має бути погоджено в юридичній площині.