

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ)

ПОЗИЦІЯ № 14-04/2023-3

(офіційна заява)

Щодо рекомендації МОЗ України стосовно заходів з імунопрофілактики

Дані рекомендації НТГЕІ мають рекомендований характер.

Щеплення проти поліомієліту дітей з порушенням Календаря профілактичних щеплень при переході на використання інактивованої поліомієлітної вакцини взамін оральної поліомієлітної вакцини.

- Наголошуємо на важливості досягнення високого рівня охоплення вакцинацією проти інфекційних хвороб, щеплення яких передбачено календарем та проти COVID-19.

- Наголошуємо на важливості надолуження щепленнями дітей з порушенням Календаря профілактичних щеплень проти поліомієліту враховуючи спалах поліомієліту, що зумовлений циркулюючим вакциноспоріденим вірусом поліомієліту типу 2 (сVDPV2) в Україні.

- Висловлюємо в контексті Позиції № 29-12/2022 запропоновану схему вакцинації дітей з порушенням Календаря профілактичних щеплень при переході на використання інактивованої поліомієлітної вакцини взамін оральної поліомієлітної вакцини:

	Для дітей віком від 3 місяців до 6 років 11 місяців 29 днів			
Вакцина	Мінімальний інтервал між дозами			
	1-2-а дози	2-3-я дози	3-4-а дози	4-5-а дози
Проти поліомієліту інактивована	4 тижні	4 тижні	6 місяців	вводиться в 6 років, якщо минув понад 1 рік від 4 дози. Якщо 4 доза введена після 5 років, то вона зараховується як ревакцинація в 6 років.

Для дітей віком від 7 до 17 років 11 місяців 29 днів

Вакцина	Мінімальний інтервал між дозами		
	1-2-а дози	2-3- дози	ревакцинація
Проти поліомієліту інактивована	4 тижні	4 тижні	Четверта доза ІПВ показана, якщо всі попередні дози були введені у віці до 7 років або якщо третя доза була введена через <6 місяців після другої дози. В даному випадку четверта доза має бути введена з інтервалом 6 місяців від третьої.

- Якщо остання доза вакцинального комплексу (перша ревакцинація за віком у 18 місяців) проти поліомієліту збігається з віком проведення ревакцинації у 6 років, перша ревакцинація зараховується як ревакцинація за віком у 6 років.

- Щеплення дітей з порушенням цього Календаря призначаються лікарем з такого розрахунку, щоб дитина встигла одержати чотириразове щеплення проти поліомієліту до 17 років 11 місяців 29 днів. У разі неможливості отримати 4 дози вакцини проти поліомієліту дитиною до 17 років 11 місяців 29 днів вводять стільки доз, скільки дитина встигне отримати до виповнення їй зазначеного віку.

- Для проведення всіх щеплення незалежно від віку використовується інактивована вакцина проти поліомієліту.

- Особам, старшим 18 років, вакцинація проводиться за епідемічними показаннями.