

Таблиця 1. Рекомендації щодо вакцинації новонароджених у контексті пандемії COVID-19

	Мати ¹	Новонароджена дитина	Пологи відбуваються у медичних закладах/пологових будинках	Пологи відбуваються поза межами медичних закладів/пологових будинків
Сценарій А	Немає клінічної підозри на інфекцію COVID-19	Немає клінічної підозри на інфекцію COVID-19	Рекомендації з урахуванням національного календаря щеплень	Рекомендації з урахуванням національного календаря щеплень та найбільш відповідної стратегії вакцинації ²
Сценарій В	Клінічна підозра, але без лабораторного підтвердження інфекції COVID-19	Немає клінічної підозри на інфекцію COVID-19 ³	→ Зробити щеплення проти гепатиту В (упродовж перших 24 годин життя) → Зробити щеплення БЦЖ (одразу після народження або якнайшвидше)	→ Зробити щеплення проти гепатиту В (упродовж перших 24 годин життя або якнайшвидше) → Зробити щеплення БЦЖ (одразу після народження або якнайшвидше)
Сценарій С	Лабораторно підтверджена інфекція COVID-19 (з клінічною підозрою чи без)	Немає лабораторного підтвердження інфекції COVID-19 (з клінічною підозрою чи без)	Новонароджену дитину слід вважати контактом підтвердженого випадку (матері), яка могла передати COVID-19 іншим С. 1. Якщо новонароджена дитина не має симптомів COVID-19: → Зробити щеплення проти гепатиту В (протягом перших 24 годин життя) → Зробити щеплення БЦЖ (одразу після народження або якнайшвидше) С. 2. Якщо у новонародженої дитини є симптоми, сумісні з COVID-19: → Зробити щеплення проти гепатиту В (протягом перших 24 годин життя) → Відкласти вакцинацію БЦЖ до виписки	Новонароджену дитину слід вважати контактом підтвердженого випадку (матері), яка могла передати COVID-19 іншим С. 3. Якщо новонароджена дитина не має симптомів COVID-19 і якщо в контексті пандемії COVID-19 є така можливість, запропонувати вакцинацію вдома: → Зробити щеплення проти гепатиту В (протягом перших 24 годин життя) → Зробити щеплення БЦЖ (одразу після народження або якнайшвидше) С. 4. Якщо у новонародженої дитини є симптоми, сумісні з COVID-19: → Якщо в контексті пандемії COVID-19 є така можливість, запропонуйте щеплення від гепатиту В у домашніх умовах (протягом перших 24 годин життя або якнайшвидше) → Відкласти вакцинацію БЦЖ до часу, коли мине принаймні 14 днів після зникнення симптомів COVID-19

¹ Клінічна підозра та/або лабораторне підтвердження інфекції COVID-19 у матері стосується безпосередньо перед- та післяпологового періоду.

² Можна розглядати такі варіанти: вакцинація у кабінеті щеплень ЗОЗ, вакцинація вдома, вакцинальні пункти, бригади або мобільні групи.

³ Новонароджені, народжені від матері з клінічною підозрою на COVID-19, але без лабораторного підтвердження (результатів ще нема або тести недоступні), не є підозрілими випадками (17).

Таблиця 1. Рекомендації щодо вакцинації новонароджених у контексті пандемії COVID-19 (продовження)

	Мати ⁴	Новонароджена дитина	Пологи відбуваються у медичних закладах/пологових будинках	Пологи відбуваються поза межами медичних закладів/пологових будинків
<p>Сценарій</p> <p>D</p>	<p><u>Лабораторно підтверджена інфекція COVID-19</u> (з клінічною підозрою чи без)</p>	<p><u>Лабораторно підтверджена інфекція COVID-19</u> (з клінічною підозрою чи без)</p>	<p>Новонароджену дитину слід вважати підтвердженим випадком, який може передати COVID-19 іншим</p> <p>D. 1. Якщо новонароджена дитина не має симптомів COVID-19 або має помірні клінічні симптоми:</p> <p>→ Відкласти щеплення проти гепатиту В до виписки, крім немовлят, народжених від HBsAg/HBeAg-позитивних матерів, зробити щеплення проти гепатиту В протягом перших 24 годин або якнайшвидше</p> <p>→ Відкласти вакцинацію БЦЖ до виписки</p> <p>D. 2. Якщо новонароджена дитина має помірні або тяжкі клінічні симптоми:</p> <p>→ Відкласти щеплення проти гепатиту В до виписки, крім немовлят, народжених від HBsAg/HBeAg-позитивних матерів, та, якщо дозволяє клінічна ситуація, зробити щеплення проти гепатиту В протягом перших 24 годин або щойно дитина буде клінічно стабільна</p> <p>→ Відкласти вакцинацію БЦЖ до виписки</p>	<p>Новонароджену дитину слід вважати підтвердженим випадком, який може передати COVID-19 іншим</p> <p>D. 3. Якщо новонароджена дитина не має симптомів COVID-19 або має помірні клінічні симптоми:</p> <p>→ Відкласти щеплення проти гепатиту В та БЦЖ до завершення 14-денного періоду (з моменту діагностики з допомогою лабораторного підтвердження)⁵. Щодо немовлят, народжених від HBsAg/HBeAg-позитивних матерів, запропонувати зробити щеплення проти гепатиту В протягом перших 24 годин або якнайшвидше у домашніх умовах</p> <p>D. 4. Якщо новонароджена дитина має помірні або тяжкі клінічні симптоми COVID-19:</p> <p>→ Спрямувати до служби охорони здоров'я та відкласти вакцинацію відповідно до рекомендацій D. 2</p>

⁴ Клінічна підозра та/або лабораторне підтвердження інфекції COVID-19 у матері стосується безпосередньо перед- та післяпологового періоду.

⁵ Період для запобігання ризику передавання COVID-19 іншим (9).