

Епідемічна ситуація з ВІЛ-інфекції в Україні станом на 01.07.2017 р.*

За період 1987-2017 (6 міс.) рр. серед громадян України зареєстровано 306 295 ВІЛ-інфікованих осіб, у тому числі 97 584 випадки захворювання на СНІД та 43 206 випадків смерті від захворювань, зумовлених СНІДом.

За даними сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ в Україні, за 6 місяців 2017 р. обстежено на ВІЛ-інфекцію 1 220 385 громадян України проти 1 161 654 за 6 місяців 2016 р. Кількість ВІЛ-позитивних результатів за 6 місяців 2016 р. зросла до 11 665 проти 10 258 за аналогічний період 2016 р.

Поширеність ВІЛ серед громадян України (код 100), відповідно, зросла та склала 0,96% проти 0,88%. Найвища поширеність ВІЛ встановлена серед таких контингентів осіб, які обстежувались на ВІЛ-інфекцію:

- особи, які мали статеві контакти з ВІЛ-інфікованими особами (код 101) (9,6%);
- особи, які перебували у місцях позбавлення волі (код 112) (4,8%);
- особи, обстежені анонімно (код 114) (2,7%);
- особи з клінічними ознаками захворювань (код 113) (2,1%);
- ЛВІН (код 102) (1,6%).

Поширеність ВІЛ серед іноземців та осіб без громадянства (код 200) становила за 6 місяців 2017 р. 0,8% та зменшилась вдвічі проти показника відповідного періоду 2016 р. (1,5%).

За 6 місяців 2017 р. в Україні відмічається зростання кількості зареєстрованих ВІЛ-інфікованих громадян – взято на облік 8 871 ВІЛ-інфікована особа, що на 16,6% більше, ніж за аналогічний період 2016 р. (7 610 осіб). Рівень захворюваності на ВІЛ-інфекцію в країні зріс на 17,1% та склав 20,9 на 100 тис. населення проти 17,8 у відповідний період 2016 р. (рис. 1).

Перевищують середній показник по країні рівні захворюваності на ВІЛ-інфекцію Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Чернігівської областей та м. Києва.

Суттєве зростання захворюваності на ВІЛ-інфекцію за 6 міс. 2017 р., проти відповідного періоду 2016 р., зареєстровано у Вінницькій (темп приросту +112,3%), Дніпропетровській (+51,6%), Кіровоградській (+51,2%) та Хмельницькій (+62,4%) областях.

У структурі шляхів передачі ВІЛ-інфекції серед осіб з уперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції продовжує зростати частка осіб із статевим (гомо- та гетеросексуальним) шляхом інфікування ВІЛ. За 6 місяців 2017 р. цей показник досяг 63,7% проти 59,8% за відповідний період минулого року. Частка осіб, які інфікувались ВІЛ унаслідок введення наркотичних речовин ін'єкційним шляхом, становила 22,0% проти 22,2% у минулому році. Актуальність даного шляху зберігається у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Львівській, Полтавській, Харківській, Херсонській областях та у м. Києві.




Рисунок 1. *Захворюваність на ВІЛ-інфекцію по регіонах України за 6 місяців 2016 р. та 6 місяців 2017 р. (в показниках на 100 тис. населення)*

Протягом першого півріччя 2017 р. зареєстровано 4 687 нових випадків СНІДу, у порівнянні з 4 030 випадками за відповідний період минулого року. Рівень захворюваності на СНІД в країні зріс на 16,8% та склав 11,0 на 100 тис. населення проти відповідного показника за 6 місяців 2016 р. (9,4).

Зростання рівнів захворюваності на СНІД за 6 місяців 2017 р. проти відповідних показників за аналогічний період минулого року відбулось у 15 регіонах, найвищі темпи зростання зареєстровано у Вінницькій та Сумській областях (+126,2% та +109,4%, відповідно). Перевищують середній показник по Україні показники захворюваності на СНІД Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Кіровоградської, Донецької областей.

У 10 регіонах країни за 6 місяців 2017 р. зареєстровано зниження рівнів захворюваності на СНІД, у порівнянні з відповідними показниками минулого року. Найбільш суттєво захворюваність на СНІД знизилась у Тернопільській та Чернівецькій областях (-41,3% та -44,3%, відповідно).

За 6 місяців 2017 р. зареєстровано 1 496 випадків смерті від СНІДу проти 1 428 випадків за відповідний період минулого року. Показники смертності від СНІДу становили 3,5 та 3,3 на 100 тис. населення, відповідно. Темп зростання показника смертності від СНІДу склав 5,2%.

Збільшення регіональних показників смертності від СНІДу, у порівнянні з відповідними показниками минулого року, відмічається у 15 регіонах. Високі темпи приросту показника смертності від СНІДу зареєстровано у Сумській

(101,7%), Київській (79,0%), Харківській (77,0%), Одеській (55,8%), Закарпатській (50,1%), Івано-Франківській (45,7%) областях та м. Києві (55,6%).

Показники смертності від СНІДу Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської областей та м. Києва перевищують середній показник по Україні.

Основною ко-інфекцією та причиною смерті у хворих на СНІД залишається ТБ, який протягом першого півріччя 2017 р. став причиною смерті у кожному другому випадку смерті від СНІДу (772 померлих; 51,6% від кількості померлих від СНІДу).

Станом на 01.07.2017 р., у ЗОЗ служби СНІДу під медичним наглядом перебувало 136 965 ВІЛ-інфікованих громадян України, з них 41 524 хворих з діагнозом СНІД. Показник поширеності ВІЛ-інфекції становив 323,7 на 100 тис. населення та на 5,5% був вище інтенсивного показника за відповідний період минулого року (306,8). Показник поширеності СНІДу становив 98,1 на 100 тис. населення та зріс проти показника відповідного періоду минулого року (85,8) на 14,4%. Найвищі рівні поширеності ВІЛ-інфекції реєструвались в Одеській (861,8 на 100 тис. населення), Дніпропетровській (827,0), Миколаївській (755,0), Херсонській (409,6), Київській (385,8), Чернігівській (383,7) областях та у м. Києві (424,6) (рис. 2).




Рисунок 2. Поширеність ВІЛ-інфекції та СНІДу за даними медичного нагляду по регіонах України станом на 01.07.2017 р. (в показниках на 100 тис. населення)

*без урахування статистичних даних АР Крим з 2014 року та частини території проведення антитерористичної операції з 2015 року